

植物如何安然度夏？

■ 龚晴丽

盛夏烈日炎炎，进入三伏天，气温不断攀升。不仅人难以忍受酷暑，对于家中的花卉植物来说，要想安稳度夏也不是一件容易事。室内的一些植物动辄焦边卷叶、奄奄一息，这时便需要掌握合适的养护技巧，让植物在夏日也能焕发勃勃生机。

1. 浇水增湿

高温对植物的生长是很不利的，水分蒸发较快，及时补水就显得尤为重要，特别是一些阔叶植物。因此，浇水的频率应适当增加。但是，夏季浇水以早上和傍晚为宜，切忌中午浇水。中午日头正盛，在烈日下浇水很容易造成根系不适，导致植株死亡。如果大中午的发现植物干了，最好先将其移到屋内通风阴凉处，缓一段时间后再行浇水。浇水时，水量也应适当，保持盆土稍湿润为宜，浇水过多盆土久湿易引起烂根，浇水较少则易造成根部萎缩，千万不能浇半截水。在持续高温、空气干燥时，可以经常向植物的茎叶喷洒水雾，或者在植物周围地面洒水，但也要注意，不要顶着烈日喷雾，否则强烈的光照会让水珠瞬间蒸发，造成叶片灼伤。

此外，不同植物的生长习性不同。夏季浇水量的多

少，要根据花卉种类、植株大小、盆土实际干湿情况而定。一般草本花卉含水量多，蒸腾强度大，浇水宜多；一般木本花卉浇水可适当少些。有些植物夏季处于休眠状态，如多肉、君子兰、玉树、天竺葵等等，对于这些植物，要避免过度浇水导致烂根。

2. 遮荫通风

夏天光线强，我们要适当做遮荫处理，防止暴晒，就要尽量避免太阳光线直接照射。可以将植物移到略有遮荫或者通风良好、有充足散射光的地方。良好的通风透气环境，可以减少病菌的滋生，降低盆土的温度，防止根部被闷坏。在做遮荫通风时，都应掌握适度原则。

3. 施肥得当

夏季施肥，也要根据植物的生长习性“区别对待”。一些花草，如月季、三角梅、茉莉花等在夏季依旧能保持良好的生长态势甚至正常开花，对养分的需求也相对较大，正确的做法是继续施肥，但一定要薄肥勤施，也就是降低肥料浓度，提高施肥频率。对生长旺盛、长势较好、生长条件好的植物来说，可10~15天施一次稀薄液肥。施肥同样要避免在高温时进行，最好在晴天傍晚盆土较干时施肥，次日要注意补水。

但对于一些高温休眠的植物来说，夏季时对养分需求不高，施肥不当反而会造成肥害，因此夏季应该尽量少施肥甚至不施肥。



到底什么时候换盆？月季也会发送信号

■ 陈磊

新买的月季苗，要不要换盆？很多养花新手对换盆这个事情都挺怕的，因为总是一换盆月季就容易出现萎蔫，所以经常是买了带盆的月季就不换盆。实际上，苗圃的育苗盆都是偏小的，如果不是在封闭阳台上养殖，那么最好还是换个大一点的盆，不然月季新枝长出来之后，浇水施肥就会比较辛苦了。

实际上，如果月季出现了①叶片变黄掉落；②花盆里有水分但是枝梢萎蔫的情况，充分浇水了但是下部分的叶片还是变黄凋落、新芽的枝梢枯萎，这就是月季在告诉我们“需要换盆了”的信号。

很多时候，发生上述的问题原因是根系盘结，所以要通过换盆来给予

根系更多的生长空间。早晨浇透了水，不到中午枝梢就发软，这表示相对于月季植株的体量土壤的保水量已经不足了，需要通过换盆来增加土壤的保水量。

换盆的时机一般是根据日历和季节来进行的，给月季换盆要尽量选择春秋两季进行，若想要在春季进行可选择3月份左右，若想要在秋季进行可选择9月份。避免在植株开花期间和花期前进行，在温度太高或者是太低的时候换盆，不但植株恢复得慢，还很容易出现不良的表现。但如果月季已经明确地表示出需要换盆的信号，就可以酌情考虑换盆了。

你家宠物有“干眼症”吗？

■ 王淼

您家宝贝的眼睛，有下列症状吗？

一、黏液累积在眼角，眼睛分泌物增加；二、眼睛红肿；三、眼角干燥；四、眼睛常常搔痒或有斜视习惯；五、眼睛无法张开或只能部分张开；六、眼角缺乏透明度；七、眼角有溃疡。

如果有以上任何一种，或一种以上的情形出现，都代表府上宝贝可能罹患了“干眼症”。

干眼症起因于眼睛干燥或缺乏泪液的产生；泪液在保持眼球健康上，扮演非常重要的角色，藉由它提供水分和润滑，来移除异物；同时泪液也提供氧气和养分。另外，适当的泪液分泌，还可以抗菌。

罹患干眼症的动物，假如不做任何处理，由于眼睛遭受持续性的刺激，将可能造成角膜炎甚至眼盲。

干眼症的诊断，可由临床症状来判定，再经由 Schirmer 泪液测试(STT)来确诊。所谓泪液测试是将一小片特殊的滤纸，放在宠物下眼睑边缘，一分钟后，再评量泪液被滤纸所吸收的潮湿部分，就可得知泪液含量是否低于正常标准值；若低于正常标准值，即诊断为干眼症。

若家里宝贝有干眼症的症状，请到动物医院接受泪液测试；早期发现，均能以药物有效控制，让宠物的灵魂之窗常保明亮健康。